## O3.54. Satisfacción a largo plazo y sudoración compensatoria tras simpatectomía toracoscópica en pacientes pediátricos con hiperhidrosis primaria

**Gracia Sevilla[1], Ana Lain[1], Laura García Martinez[1], María Díaz Hervás[1], Carlos Giné[1].**
1. Hospital Universitario Vall d´Hebron. Barcelona

### Objetivos

Evaluar los resultados percibidos a largo plazo tras simpatectomía toracoscópica (VATS-S) en pacientes pediátricos con hiperhidrosis primaria.

### Material y método

Entre 2016 y 2024 se realizaron 29 simpatectomías toracoscópicas; se excluyeron nueve pacientes intervenidos por indicación cardiológica, quedando 20 pacientes con hiperhidrosis primaria. Todos fueron valorados previamente por dermatología y habían fracasado a tratamientos conservadores. Se realizó VATS-S bilateral a nivel R3 en 2 pacientes y R3–R4 en 18.

Los resultados se recogieron mediante un cuestionario telefónico estructurado que evaluaba mejoría clínica, sudoración compensatoria y su impacto funcional, satisfacción global (escala 0–10) y disposición a repetir o recomendar el procedimiento. El seguimiento se calculó desde la cirugía hasta la realización de la encuesta.

### Resultados

El cuestionario fue completado por 16 de 20 pacientes (80%). La mediana de edad en el momento de la cirugía fue de 14 años (rango 10–16) y la mediana de seguimiento de 38,5 meses (3–98). Todos los pacientes refirieron mejoría clínica. La puntuación mediana de satisfacción fue de 9/10 (7–10), y todos repetirían el procedimiento y lo recomendarían.

La sudoración compensatoria apareció en 11 pacientes (73%), aunque solo 2 (12,5%) presentaron síntomas severos con interferencia relevante en las actividades diarias. No se registraron complicaciones postoperatorias mayores.

### Conclusiones

En pacientes pediátricos cuidadosamente seleccionados con hiperhidrosis primaria refractaria al tratamiento conservador, la simpatectomía toracoscópica proporciona un excelente control sintomático a largo plazo y elevada satisfacción. Aunque la sudoración compensatoria es frecuente, suele ser moderada y con impacto limitado en la vida diaria.