O3.13. Calidad de vida y satisfacción tras reconstrucción auricular con cartílago autólogo en población pediátrica.

raquel fernandez signes[1], alejandro manzanares quintela[1], maria coronas soucherion[1], mireia riba martínez[1], miguel bejarano serrano[1], xavier tarrado castellarnau[1].
1. Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues del Llobregat

Introducción

La microtia es una malformación congénita del pabellón auricular. Uno de los abordajes es la reconstrucción quirúrgica con cartílago autólogo. Es un procedimiento de alta complejidad técnica. Dado que el objetivo es fundamentalmente estético y psicosocial, es importante evaluar la percepción directa del paciente sobre los resultados obtenidos.

Objetivos

Evaluar la calidad de vida relacionada con la salud y el grado de satisfacción estética en pacientes pediátricos intervenidos de reconstrucción auricular mediante técnica autóloga en nuestro centro.

Material y método

Estudio observacional, descriptivo y transversal en una muestra de 35 pacientes que completaron la reconstrucción del pabellón auricular. La recogida de datos se hizo mediante revisión de historias y entrevistas clínicas estructuradas. Se analizaron variables demográficas y resultados reportados por el paciente sobre la satisfacción estética y calidad de vida con los cuestionarios FACE-Q y EQ-5D-Y (versión juvenil), cuya puntuación esta entre 0-100 puntos.

Resultados

Se evaluaron 27 pacientes (67% varones; edad media 13,8±2,19 años). En el EQ-5D-Y, la percepción del estado de salud alcanzó una mediana de 85 (rango intercuartílico-RIC:70-90). En el FACE-Q, la mayor satisfacción se halló en las variables “preocupación por la apariencia” (mediana:78 RIC:68-91) y “efectos adversos” (media:76±13). La “apariencia de orejas” fue la variable con menor puntuación (media:60±14). La función social mostró una alta variabilidad interindividual (mediana:76; RIC:54-91).

Conclusiones

La reconstrucción autóloga ofrece alta satisfacción general y alivio de la preocupación estética. Sin embargo, la apariencia específica auricular y la función social presentan resultados más modestos y heterogéneos, sugiriendo la necesidad de apoyar a estos pacientes en diferentes ámbitos.