



### **03.37. Dos décadas de resultados en válvulas uretrales posteriores: función renal, vesical y sexual en la edad adulta tras la transición al cuidado de adultos**

**Carla Ramírez Amorós<sup>1</sup>, Laura García Espinosa<sup>1</sup>, María María López Canelada<sup>1</sup>, Virginia Amesty Morello<sup>1</sup>, Susana Rivas Vila<sup>1</sup>, Roberto Lobato Romera<sup>1</sup>, María José Martínez Urrutia<sup>1</sup>, Pedro López Pereira<sup>1</sup>.**

1. Hospital Universitario La Paz, Madrid

#### **Introducción**

Los resultados tras la transición a adultos en pacientes con válvulas uretrales posteriores (VUP) son limitados.

#### **Objetivos**

El objetivo de este trabajo es evaluar la función renal, el estado vesical y la salud sexual en una cohorte adulta de pacientes con VUP.

#### **Material y método**

Estudio retrospectivo de pacientes con VUP tratados entre 1995-2005 en un centro terciario. Se analizaron variables renales, vesicales y sexuales.

#### **Resultados**

Se incluyeron 40 pacientes, con una edad media actual de 25,5(19-29) años y una mediana de seguimiento de 26(19-29) años. 13 pacientes (35%) fueron sometidos a ureterostomía inicial y 27(65%) a resección primaria. El grupo con ureterostomía presentó valores iniciales de creatinina significativamente superiores y mayores tasas de trasplante renal (61% frente a 22%;  $p < 0,05$ ), con edad comparable al trasplante. El 65% mantuvo un filtrado glomerular estimado normal sin trasplante.

Había disfunción vesical en el 42,5% de los pacientes, que se asoció a peor pronóstico renal. El 57% de los pacientes trasplantados presentaban disfunción vesical, y todos los pacientes con baja complianza o fracaso miogénico requirieron trasplante renal. Solo el 12% refirió síntomas miccionales en la edad adulta. 31 pacientes completaron el cuestionario de función sexual, observándose disfunción eréctil en 6,4% y retraso eyaculatorio en 9,6%.

#### **Conclusiones**

Las VUP continúan teniendo repercusión renal y vesical en la edad adulta, siendo la baja complianza vesical y el fracaso miogénico determinantes de mal pronóstico renal. A pesar de ello, la mayoría de los pacientes mantiene un filtrado glomerular estimado normal, con mínima disfunción miccional o sexual.