O3.37. Dos décadas de resultados en válvulas uretrales posteriores: función renal, vesical y sexual en la edad adulta tras la transición al cuidado de adultos

Carla Ramírez Amorós[1], Laura García Espinosa[1], María Maria López Canelada[1], Virginia Amesty Morello[1], Susana Rivas Vila[1], Roberto Lobato Romera[1], María José Martínez Urrutia[1], Pedro López Pereira[1].
1. Hospital Universitario La Paz, Madrid

Introducción

Los resultados tras la transición a adultos en pacientes con válvulas uretrales posteriores (VUP) son limitados.

Objetivos

El objetivo de este trabajo es evaluar la función renal, el estado vesical y la salud sexual en una cohorte adulta de pacientes con VUP.

Material y método

Estudio retrospectivo de pacientes con VUP tratados entre 1995-2005 en un centro terciario. Se analizaron variables renales, vesicales y sexuales.

Resultados

Se incluyeron 40 pacientes, con una edad media actual de 25,5(19–29) años y una mediana de seguimiento de 26(19–29) años. 13 pacientes (35%) fueron sometidos a ureterostomía inicial y 27(65%) a resección primaria. El grupo con ureterostomía presentó valores iniciales de creatinina significativamente superiores y mayores tasas de trasplante renal (61% frente a 22%; $p<0,05$), con edad comparable al trasplante. El 65% mantuvo un filtrado glomerular estimado normal sin trasplante.

Había disfunción vesical en el 42,5% de los pacientes, que se asoció a peor pronóstico renal. El 57% de los pacientes trasplantados presentaban disfunción vesical, y todos los pacientes con baja complianza o fracaso miogénico requirieron trasplante renal. Solo el 12% refirió síntomas miccionales en la edad adulta. 31pacientes completaron el cuestionario de función sexual, observándose disfunción eréctil en 6,4% y retraso eyaculatorio en 9,6%.

Conclusiones

Las VUP continúan teniendo repercusión renal y vesical en la edad adulta, siendo la baja complianza vesical y el fracaso miogénico determinantes de mal pronóstico renal. A pesar de ello, la mayoría de los pacientes mantiene un filtrado glomerular estimado normal, con mínima disfunción miccional o sexual.