



### 03.28. Qué es lo que más valoran los pacientes tras la reparación de hipospadias

**Paula Salcedo Arroyo<sup>2</sup>, Anna Domènech Plana<sup>1</sup>, Raimon Ripoll Palmes<sup>1</sup>, Oriol Martín Sole<sup>1</sup>, Sonia Pérez Bertólez<sup>1</sup>, Jordi Prat Ortells<sup>1</sup>, Jesús González Cayón<sup>1</sup>, Irene de Haro Jorge<sup>1</sup>, Maria Elena Muñoz Fernández<sup>1</sup>, García Aparicio Luís<sup>1</sup>.**

1. Sant Joan de Déu Barcelona
2. Hospital Mutua de Terrassa

#### Objetivos

Identificar los aspectos prioritarios para los pacientes (patient reported outcomes, PRO) tras la reparación de hipospadias y su asociación con variables clínicas.

#### Material y método

Estudio transversal en pacientes >18 años intervenidos de hipospadias durante la infancia. Los pacientes valoraron, de 0 (nada) a 10 (mucho), la relevancia de los ítems de un cuestionario preliminar de PROs enviado por correo electrónico tras contacto telefónico previo. El cuestionario incluyó cinco dominios: apariencia penénea, función urinaria, social, salud psicológica y sexual. Se registraron: tipo de hipospadias, el número de cirugías y reintervención. Se realizó análisis descriptivo y regresión lineal univariante y multivariante.

#### Resultados

De los 143 pacientes contactados, se envió la encuesta a 107 y 39 la completaron. El 72,5% presentó hipospadias distal, 20% medio y 7,5% proximal. El 52,5% fue reintervenido. El número de cirugías fue una en el 52,5%, el 25% dos y el 22,5% tres o más. La edad mediana en la primera intervención fue de 2.28 [RIC 2,05-3,50]. Las puntuaciones fueron elevadas en todos los dominios (medianas  $\geq 7/10$ ). En el análisis multivariante, los pacientes reintervenidos dieron menos importancia a los aspectos psicológicos ( $p=0.024$ ). No se observaron asociaciones con el tipo de hipospadias ni el número de cirugías.

#### Conclusiones

Los pacientes otorgan alta importancia a todos los dominios evaluados. La reintervención se asocia inversamente con la valoración psicológica. La baja tasa de respuestas muestra la necesidad de realizar estudios más amplios para confirmar estos hallazgos y orientar la evaluación centrada en el paciente.