



### **03.30. Valor y calidad de la atención percibida en pacientes con hipospadias: estudio observacional transversal**

**Víctor Vázquez Vázquez<sup>1</sup>, Rosa María Romero Ruiz<sup>1</sup>, Jose Francisco Lozano<sup>2</sup>, Moserrat Gomez de Terreros<sup>2</sup>, Gema Medina<sup>2</sup>.**

1. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla
2. Facultad de Psicología. Universidad de Sevilla

#### **Introducción**

El manejo del hipospadias es tema de debate, especialmente las formas leves, donde la indicación quirúrgica y el impacto a largo plazo de la decisión no están establecidos.

#### **Objetivos**

Analizar el valor percibido en pacientes con hipospadias intervenidos y no intervenidos, integrando la valoración anatómica, la percepción genital y el grado de arrepentimiento respecto a la decisión terapéutica.

#### **Material y método**

Estudio observacional transversal de pacientes con hipospadias, intervenidos y no intervenidos, revisados entre 2023-2025. Se realizó entrevista clínica estructurada y valoración anatómica mediante escala HOPE y evaluación de la función del tracto urinario inferior (PLUTSS). La percepción del pene fue analizada mediante el Penile Perception Score (PPS) y el grado de arrepentimiento parental respecto a la decisión adoptada mediante la Regret Scale. Se realizó un análisis comparativo según la decisión de operar (grupo OP vs grupo NoOP).

#### **Resultados**

Se analizaron 89 pacientes (edad media 7,9 años); el 71,8% presentaban hipospadias distales. El 22,5% pertenecían al grupo NoOP. Sin diferencias significativas entre grupos ( $p > 0,05$ ). La percepción del pene fue superior en el grupo OP (PPS 85,3% vs 68,4%;  $p < 0,05$ ). Los padres del grupo OP mostraron mayor satisfacción con su decisión ( $p < 0,001$ ). Solo los intervenidos presentaron DTUI (13%). En el grupo OP, una menor puntuación HOPE se asoció a una menor PPS, aunque esta fue superior a la del grupo NoOP.

#### **Conclusiones**

La cirugía del hipospadias se asocia a una mejor percepción genital y a menor grado de arrepentimiento, incluso en pacientes con resultados clínicos subóptimos.