P.56. Eficacia del manejo mínimamente invasivo en traumatismo pancreático de alto grado.

Jesús Crespo Estrada[1], Romina Lorena Ferlini Fuembuena[1], Lidia Dolores Ayuso González[1], Verónica Alonso Arroyo[1], Gadea Hontoria Bautista[1], Raquel Ros Briones[1], Sara Monje Fuente[1], Marta Ortega Escudero[1].
1. Hospital Universitario de Burgos, Burgos

Introducción Casos Clínicos

Los traumatismos pancreáticos de bajo grado se manejan clásicamente de manera conservadora y los de alto grado quirúrgicamente; sin embargo, nuevas alternativas terapéuticas amplían las opciones actuales para estos últimos.

Resumen del caso

Niño de 10 años acude a urgencias tras traumatismo cerrado de abdomen con manillar de bicicleta. Presenta dolor y defensa epigástricos asociado a vómitos.

Se objetiva amilasa de 1151 Ul/L en la analítica sanguínea y una solución de continuidad en cuerpo pancreático sin descartarse laceración del conducto de Wirsung en el TC abdominal.

Tras un manejo inicialmente conservador se realiza ColangioRMN que confirma laceración pancreática del cuerpo-cola con posible disrupción del Wirsung (grado III de AAST) y una gran colección líquida extrapancreática retroperitoneal.

Tras controlar el crecimiento de la colección mediante ecografías seriadas, a las 4 semanas desde el traumatismo se realiza drenaje de la misma mediante ecoendoscopia, colocando una prótesis de aposición luminal que conecta el pseudoquiste con la cavidad gástrica, con evolución posterior favorable.

A las 8 semanas tras la colocación de la prótesis se realiza gastroscopia para su retirada. Los controles ecográficos posteriores confirman resolución del pseudoquiste y ausencia de lesiones pancreáticas objetivables.

A las 10 semanas de seguimiento el paciente permanece asintomático, realizando su actividad diaria habitual.

Comentarios

Históricamente se ha considerado que el manejo de los traumatismos pancreáticos de alto grado debe ser quirúrgico. Sin embargo, la evolución de las técnicas endoscópicas mínimamente invasivas ofrece nuevas alternativas terapéuticas con buenos resultados en casos seleccionados.